



**FASES DEL CULTIVO DEL DURAZNERO**

REQUERIMIENTOS TERMICOS E HIDRICOS DEL CULTIVO DE DURAZNERO								
	RECESO	SALIDA DEL RECESO	BOTON ROSADO	INICIO DE FLORACIÓN	FLORACIÓN	CAIDA DE PETALOS	FRUTO EN CRECIMIENTO	MADURACIÓN
Temperatura óptima	5°C	>10 °C	18 - 22	20- 25	20- 25	22 - 26	20 - 24° C	20 - 24° C
Temperatura crítica	-1°C	<10 °C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C
Humedad optima	Sensible al déficit de agua	Sensible al déficit de agua	Sensible al déficit de agua	sensible al déficit de agua	No lluvioso y no nublado. Sensible al déficit de agua	sensible al déficit de agua	No lluvioso. Sensible al déficit de Agua	No lluvioso. Sensible al déficit de Agua
Periodo Vegetativo			15 días	15 días	36 días	25 días	100 días	
Horas frio	600-800	0						
horas luz		10 a 14						
Cultivo en desarrollo var. De partir Blancona y espiriteño	mayo, junio julio, agosto	septiembre		octubre	octubre noviembre	diciembre enero	enero febrero	marzo
Cultivo en desarrollo var. Ulincate Saavedra y Gumucio Reyes	mayo, junio julio, agosto	septiembre		octubre	octubre noviembre	diciembre enero	enero febrero	marzo a 10 de abril

Elaborado por Ing. Agr. Sergio Campero Marin