



FASES DEL CULTIVO DE MANÍ EN EL CHACO

REQUERIMIENTOS TERMICOS E HIDRICOS DEL CULTIVO DE MANÍ (var. overo)	Germinación	Desarrollo vegetativo	Prefloración	Floración	Formación	Desarrollo del fruto	Maduración
	Temperatura óptima	20 – 25 °C	20 – 25 °C	20 – 25 °C	20 - 25° C	20 - 25° C	20 - 25° C
Temperatura crítica	<15 °C – 32°C	<15 °C – 32°C	<15 °C – 32°C	<15 °C – 32°C	<15 °C – 32°C	<15 °C – 32°C	<15 °C – 32°C
Temperatura letal	<4 °C – 42°C	<4 °C – 42°C	<7 °C – 42°C	<7 °C – 42°C	<7 °C – 42°C	<7 °C – 42°C	<4 °C – 42°C
Humedad óptima	Sensible al déficit de agua	Sensible al déficit de agua	Tolerable al déficit de agua	sensible al déficit de agua	Tolerable	sensible al déficit de agua	sensible al déficit de agua
Periodo Vegetativo	120 días						
Cultivo en desarrollo (fecha siembra en la zona pie de monte chaqueño 2da semana de Noviembre hasta primera semana de diciembre)	noviembre	diciembre	Enero	febrero	febrero	febrero	marzo
Cultivo en desarrollo (fecha siembra en la zona de transición chaqueña 1ra y 2da semana de enero)	enero	febrero	marzo	abril	abril	abril	mayo
Cultivo en desarrollo (fecha siembra en la llanura chaqueña 1ra y 2da semana de enero)	enero	febrero	marzo	abril	abril	abril	mayo

Elaborado por Ing. Agr. Sergio Campero Marin