



MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA



BOL-RC-Nº01-2026

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RURAL Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

MONITOREO CLIMÁTICO

RESÚMEN CLIMÁTICO DEL MES DE ENERO 2026

La Paz, Bolivia
Febrero de 2026

I. Presentación.



El Monitoreo Climático es elaborado por el *Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)* bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, es un documento técnico que consolida el resumen del mes de enero de 2026. Este informe analiza el comportamiento de la precipitación acumulada y las temperaturas máximas y mínimas en el territorio nacional, aportando datos estratégicos para fortalecer el desarrollo productivo y la gestión de riesgos en Bolivia.

Palabras Clave

Normal

Es el promedio estadístico de una variable meteorológica calculado en un periodo de 30 años (para este boletín, el periodo base es 1991 a 2020).

Frecuencia de días con precipitación

Es la cantidad de días en los que se registró precipitación (igual o mayor a 0.1 mm) durante el mes evaluado.

Precipitación máxima en 24 horas histórica

Es el valor máximo de precipitación acumulada máxima en 24 horas para un mes específico a lo largo de toda la serie climática histórica.

Temperatura absoluta

Es el valor más alto de temperatura alcanzado en un momento dado durante el mes de análisis.

Temperatura mínima media

Es el promedio aritmético de las temperaturas mínimas diarias registradas durante el mes.

Temperatura máxima media

Es el promedio aritmético de las temperaturas máximas diarias registradas durante el mes.


II. Condiciones de Precipitación observadas en el mes de enero 2026.

Para el presente monitoreo climático, se sistematizaron los registros provenientes de 50 estaciones meteorológicas a nivel nacional, proporcionando una base de datos robusta para evaluar la variabilidad espacial y temporal del clima. Este análisis se centra en la cuantificación de variables hidrometeorológicas fundamentales, específicamente precipitación y temperatura, para caracterizar el comportamiento del sistema atmosférico en las distintas macrorregiones del país.

A continuación, se presentan los gráficos y mapas que describen la dinámica de las precipitaciones durante el mes de enero de 2026. Los valores observados han sido contrastados rigurosamente con la Normal Histórica del periodo de referencia 1991-2020, permitiendo identificar anomalías pluviométricas y determinar el grado de cumplimiento de los promedios estadísticos establecidos para cada región.

A. Macrorregión del Altiplano.

Gráfico 1




Fuente: SENAMHI

En el **Gráfico Nro. 1** se observa que, la estación de Oruro – Ciudad registró valores significativamente por encima de su normal de 98.5 mm, registrando 142.3 mm, un comportamiento similar en las estaciones de Potosí – Aeropuerto y Uyuni – Aeropuerto que también lograron exceder sus parámetros normales. Por el contrario, las estaciones de La Paz – El Alto, Mojo – PO, Oruro y Uyuni – PO, mostraron un déficit de precipitaciones al situarse por debajo de sus normales habituales.

B. Macrorregión de la Amazonia.


Gráfico 4



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 4** se evidencia que las estaciones de monitoreo Cobija y Riberalta de la macrorregión Amazonía registraron valores de precipitación acumulada por encima de su normal histórica durante el mes de enero las cuales alcanzaron un volumen de 519.0 mm y 329.3 mm respectivamente. Las demás estaciones de la macrorregión registraron montos acumulados significativos, sin embargo, no alcanzaron su valor normal.


Gráfico 5



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 5** se destaca la intensidad de los eventos pluviales en la macrorregión de la Amazonía, donde se observa que la totalidad de las estaciones monitoreadas mantuvieron su Precipitación Máxima 24 horas por debajo de sus umbrales extremos. Dentro de este comportamiento, las estaciones de Cobija y Riberalta reportaron las mayores intensidades diarias con registros de 101.9 mm y 84.2 mm respectivamente, cifras que no obstante se situaron lejos de sus marcas de Récord Histórico de 148.7 mm y 195.0 mm. Las estaciones de monitoreo restantes se estuvieron lejos de alcanzar su Record Histórico.

Gráfico 6




Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 6** correspondiente a la macrorregión de la Amazonía, se analiza la Frecuencia de Precipitación durante enero de 2026. Se observa que las estaciones de Cobija, Riberalta, Guayaramerín y San Borja superaron su frecuencia normal de precipitación con un registro de 24, 23, 24 y 15 días con presencia de lluvias respectivamente, frente a su valor normal de 21 días (Cobija), 18 días (Riberalta), 21 días (Guayaramerín) y 14 días (San Borja). Por otro lado, las estaciones de Rurrenabaque, Reyes y Santa Rosa se mantuvieron lejos de alcanzar su frecuencia normal de precipitación para el periodo en curso.

C. Macrorregión del Chaco.


Gráfico 7



Fuente: SENAMHI

En el **grafico Nro. 7** se evidencia que las estaciones de monitoreo de Yacuiba y Villamontes fueron las únicas de la macrorregión Chaco que registraron valores de precipitación acumulada por encima de su normal histórica durante el mes de enero, alcanzando un volumen de 207.0 mm y 186.0 mm frente a una media de 183.0 mm y 156.5 mm respectivamente. Los puntos de monitoreo restantes registraron valores por debajo de su normal.


Gráfico 8



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 8** se analizan las intensidades diarias en la macrorregión del Chaco, donde se observa que ninguna de las estaciones de monitoreo logró establecer un nuevo Récord Histórico. La Precipitación Máxima en 24 horas más elevada del sector se registró en Yacuiba con un valor de 138.2 mm, cifra que se mantuvo por debajo de su marca extrema de 194.2 mm.

Gráfico 9




Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 9** referido a la macrorregión del Chaco, se analiza la Frecuencia de Precipitación durante enero. Se observa que ninguna de las estaciones de monitoreo mostró un comportamiento más lluvioso durante el periodo de análisis. Sin embargo, la estación de Camiri fue la estación que presentó la mayor cantidad de días con lluvia (8 días), pero este valor estuvo por debajo de su frecuencia normal de precipitaciones (11 días).

D. Macrorregión de la Chiquitanía.


Gráfico 10



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 10** se observa que las estaciones de San Matías y Roboré superaron su media histórica de precipitaciones durante el mes de enero de 2026 con un monto acumulado de 235.0 mm y 143.3 mm superando su valor normal de 230.6 mm y 140.8 mm respectivamente. Por el contrario, los demás puntos de control registraron valores por debajo de su normal, entre las cuales la estación de San José fue la que mayor déficit de precipitación presentó con un monto registrado de 20.5 mm frente a 180.4 mm como su valor normal.


Gráfico 11



Fuente: SENAMHI

En el **grafico Nro. 11** se analizan las intensidades diarias de lluvia en la macrorregión de la Chiquitania durante enero de 2026, donde se confirma que solo una de las estaciones de monitoreo alcanzó su Récord Histórico, la estación de San Matías registró una intensidad de 129.5 mm de precipitación en 24 horas, siendo el mismo valor el correspondiente a su récord histórico. La estación de Roboré registró una intensidad de 93.3 mm siendo la segunda de mayor intensidad en la macrorregión, sin embargo, este valor estuvo lejos de su récord histórico de 250.0 mm. Finalmente ninguna de las demás estaciones registró intensidades que sobrepasen sus respectivas normales.

Gráfico 12




Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 12** correspondiente a la macrorregión de la Chiquitania, se detalla la Frecuencia de Precipitación del mes. Estaciones como Santa Cruz – Viru Viru y Santa Cruz – El Trompillo registraron la mayor cantidad de días con precipitación, ambas con 15 días, sin embargo, este valor no alcanzó su normal de 16 días en ambas estaciones. A pesar que ninguna de las estaciones en la macrorregión registró valores que sobrepasen sus respectivas frecuencias normales de días con precipitación, las estaciones anteriormente mencionadas fueron las que mayor cantidad de días con lluvia tuvieron en el mes monitoreado.

E. Macrorregión de Llanuras – Sabanas.


Gráfico 13



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 13** se observa que ninguna de las estaciones en la macrorregión de Llanuras - Sabanas sobrepasaron su Normal Histórica durante el mes de enero, a pesar que Trinidad y Santa Ana presentaron montos significativos de 184.4 mm y 152.8 mm respectivamente. Estos estuvieron lejos de su promedio de 301.7 mm y 270.9 mm.


Gráfico 14



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 14** se detalla la intensidad de las lluvias en la macrorregión de Llanuras - Sabanas, donde se confirma que ninguna estación sobrepasó su Récord Histórico. La mayor Precipitación Máxima en 24 h se detectó en Trinidad con un valor de 82.0 mm, cifra que se mantuvo considerablemente distante de su marca extrema de 204.1 mm.

Gráfico 15




Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 15** correspondiente a la macrorregión de Llanuras - Sabanas, se analiza la Frecuencia de Precipitación del mes. Se observa que la estación de Trinidad fue la única que sobrepasó su frecuencia normal, destacando con 21 días de lluvia frente a su promedio de 18, las demás estaciones no sobrepasaron sus respectivos valores normales.

F. Macrorregión de los Valles.


Gráfico 16



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 16** se puede constatar una tendencia mayoritariamente húmeda en la macrorregión de los Valles, donde una gran parte de las estaciones superó su Normal Histórica durante el mes de enero. En este escenario destaca la estación de Trancas - TJ, que alcanzó un volumen de 487.4 mm frente a su promedio de 175.3 mm, junto con Cañas - TJ y Sella Quebrada - TJ que registraron 258.0 mm y 170.2 mm respectivamente. Las estaciones con valores por debajo de su normal fueron San Andrés - TJ, Tucumillas - TJ, Yesera Norte - TJ, La Merced - TJ, Vallegrande, Chaqui - PO, Potosí - Tarapaya, Chuquiago - PO, La Paz - Centro y Potosí - Ciudad.


Gráfico 17



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 17** se observa que ninguna de las estaciones de la macrorregión de los Valles logró igualar su Récord Histórico de intensidad diaria. La Precipitación Máxima 24 horas más significativa se registró en la estación de Trancas - TJ con un valor de 91.2 mm, cifra que se mantuvo por debajo de su tope histórico de 105.0 mm. Por otra parte, San Andrés - TJ presentó la intensidad de precipitación más baja con apenas 7.6 mm frente a una marca histórica de 88.0 mm.

Gráfico 18




Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 18** correspondiente a la macrorregión de los Valles, se analiza la Frecuencia de Precipitación del mes de enero de 2026. Se observa que varias estaciones sobrepasaron su frecuencia normal de días con lluvia, destacando los casos de Trancas – TJ con 24 días (frente a su normal de 15), Tarija con 20 días (frente a 15), San Jacinto - TJ con 19 días (frente a 12) y Sucre (Ciudad) con 17 días (frente a 16). Por otra parte, las estaciones de Chuquiago – PO y El Villar – CH, fueron las estaciones que alcanzaron exactamente su promedio habitual al registrar 13 y 10 jornadas con precipitación respectivamente. Finalmente, un grupo significativo de estaciones quedó por debajo de su normal, entre las que se encuentran San Andrés - TJ con 9 días (frente a 15), Tucumillas - TJ con 12 días (frente a 16), La Paz - Centro con 13 días (frente a 22) y Puna - PO con apenas 9 días de lluvia frente a su frecuencia normal de 13 días.

G. Macrorregión de Yungas – Chapare.


Gráfico 19



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 19** se refleja un comportamiento pluvial excepcionalmente seco para la macrorregión Yungas - Chapare durante el mes de enero. En este punto de monitoreo, la estación de Apolo registró una precipitación acumulada de apenas 35.7 mm, lo cual representa una cifra drásticamente inferior a su Normal Histórica de 169.4 mm.


Gráfico 20



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 20** se observa que la intensidad de las lluvias en la macrorregión de Yungas - Chapare fue mínima durante enero de 2026. La estación de Apolo registró una Precipitación Máxima en 24 h de apenas 10.0 mm, situándose lejos de su Récord Histórico de 161.8 mm.

Gráfico 21




Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 21** la macrorregión de Yungas - Chapare, se presenta un escenario de marcada escasez en la Frecuencia de Precipitación durante el mes de enero. En este periodo, la estación de Apolo quedó significativamente por debajo de su normal, registrando únicamente 6 días con lluvia frente a una frecuencia normal de 14 días.

H. Precipitaciones acumuladas en el mes de enero 2026.

Mapa 1




Fuente: SENAMHI

En el **Mapa 1**, se observa el comportamiento de las precipitaciones acumuladas en el mes de enero de 2026, con un monto elevado en gran parte de las macrorregiones como las de la Amazonía, sudeste de los Valles, sudoeste del Chaco registraron montos acumulados de precipitación entre 234 mm y 519 mm, además se identifican zonas con menor acumulación de precipitaciones en gran parte de la el Altiplano, Yungas – Chapare, Chiquitanía, Llanuras – Sabanas, al noroeste, norte y noreste de los Valles y al norte y noreste del Chaco, con montos acumulados entre 20 mm y 198 mm, siendo estas las regiones con menor concentración de precipitaciones durante el mes.


I. Registro de las precipitaciones, respecto a su valor normal para el trimestre noviembre, diciembre 2025 y enero 2026.

Gráfico 22



En el registro trimestral del Altiplano, fueron dos estaciones monitoreadas la cuales superaron su Normal Histórica, la estación de Oruro - Ciudad, que acumuló 306.7 mm frente a una normal de 182.0 mm, y la estación de Uyuni - Aeropuerto, con una precipitación de 197.0 mm que superó el promedio de 105.4 mm, consolidando un trimestre con excedentes hídricos significativos en esas regiones, las demás estaciones estuvieron cercanas a su valor normal.


Gráfico 23



En el registro trimestral de la Amazonía (noviembre, diciembre 2025 y enero 2026), gran parte de las estaciones superaron su Normal Histórica. Destacan Cobija con 968.5 mm sobre la normal de 724.5 mm, Guayaramerín con 736.9 mm sobre la normal de 712.9 mm, y Santa Rosa con 648.6 mm sobre la normal de 589.2 mm, las otras estaciones mostraron valores cercanos, pero debajo de su normal trimestral, consolidando un trimestre extremadamente húmedo para toda la región amazónica.


Fuente: SENAMHI

Gráfico 24




En la macrorregión del Chaco, el trimestre noviembre, diciembre 2025 y enero 2026 cerró sin excedentes hídricos en ninguna de sus estaciones. Camiri estuvo muy cerca de superar su Normal Histórica ya que acumuló 321.1 mm, sobre su promedio normal de 335.0 mm. El resto de las estaciones no superaron su valor histórico, a pesar que si alcanzaron montos significativos.

Gráfico 25



En la macrorregión de la Chiquitania, el análisis trimestral (noviembre, diciembre 2025 y enero 2026) muestra que las estaciones Concepción con 594.3 mm frente a su normal de 461.7 mm y Roboré con 469.1 mm frente a su normal de 467.6 mm superaron sus respectivas Normales Históricas. El resto de las estaciones no superaron sus respectivos valores normales.


Gráfico 26



En la macrorregión de Llanuras - Sabanas, el análisis trimestral (noviembre, diciembre 2025 y enero 2026) muestra que ninguna de las estaciones superó su valor normal de precipitaciones, sin embargo, la estación de Trinidad con un acumulado de 590.0 mm frente a una normal de 629.0 mm respectivamente, estuvo muy cerca de superar su valor normal. Asimismo, el resto de las estaciones no superaron sus respectivos valores normales.


Fuente: SENAMHI

Gráfico 27



En la macrorregión de los Valles, el acumulado trimestral (noviembre, diciembre 2025 y enero 2026) muestra que varias de las estaciones superaron su Normal Histórica, destacando Trancas - TJ con 955.8 mm frente a su normal de 438.4 mm y Cañas - TJ con 688.0 mm. frente a su normal de 381.6 mm. No obstante, se registraron excepciones con déficits marcados en algunas estaciones como en San Andrés - TJ, que alcanzó apenas 172.6 mm frente a su normal de 519.6 mm. habituales y La Merced – TJ con 187.3 mm frente a su normal de 280.9mm.

Gráfico 28




En la macrorregión de Yungas - Chapare, el acumulado trimestral de noviembre, diciembre 2025 y enero 2026 cerró con un marcado déficit hídrico. La estación de Apolo registró una precipitación acumulada de 46.7 mm, quedando significativamente por debajo de su Normal Histórica, la cual se sitúa en 430.1 mm para este periodo. Esta situación contrasta con el comportamiento de la mayoría de las macrorregiones del país, que presentaron excedentes durante el mismo trimestre.

Fuente: SENAMHI

J. Precipitaciones observadas en el trimestre noviembre, diciembre 2025 y enero 2026.

Mapa 2



Fuente: SENAMHI.

De acuerdo con el **Mapa 2**, correspondiente al comportamiento de las precipitaciones acumuladas durante el trimestre noviembre, diciembre de 2025 y enero de 2026, se registraron precipitaciones de mayor intensidad localizadas en gran parte de la Amazonía, Llanuras – Sabana, Chiquitanía, Yungas – Chapare, Chaco, sudeste de los Valles se registraron montos acumulados entre 508 mm y 969 mm, constituyendo los valores más elevados del período analizado. Por otro lado, el resto del país, incluyendo zonas puntuales de Yungas–Chapare, gran parte de los Valles y Altiplano los registros indican precipitaciones de menor cuantía, en los cuales los montos acumulados registrados oscilaron entre 47 mm y 442 mm.


III. Temperaturas Máximas mensuales registradas en el mes de enero 2026.

A. Temperaturas Máximas Extremas.

En el **gráfico Nro. 29** se observa que las estaciones de monitoreo de Cañas – TJ y Campanario – TJ fueron las estaciones de monitoreo que superaron sus respectivas extremas históricas, por otro lado, Puerto Suarez alcanzó el mismo valor de su temperatura histórica. Del gráfico mencionado podemos destacar que 48 estaciones estuvieron por debajo de su registro histórico, 2 estaciones mencionadas anteriormente superaron su estadístico extremo y solamente 1 alcanzó su respectiva temperatura histórica, como se muestra en la siguiente tabla.

| ESTACION | MACROREGION | MAX | EXTREMAS | AÑO | FECHA | DÍA |
|-----------------|-------------|------|----------|------|-----------|---------|
| CAÑAS - TJ | VALLES | 35,0 | 34,5 | 2014 | 26/1/2026 | Lunes |
| CAMPANARIO - TJ | VALLES | 34,0 | 26,5 | 2016 | 18/1/2026 | Domingo |
| PUERTO SUAREZ | CHIKUITANÍA | 39,8 | 39,8 | 2020 | 23/1/2026 | Viernes |

Gráfico 29




Fuente: SENAMHI

B. Temperaturas Máximas Medias Mensuales.

En el **gráfico Nro. 30** muestra que, respecto a las temperaturas máximas medias mensuales, 39 estaciones de monitoreo registraron valores por encima de sus normales (1991-2020), asimismo, se puede observar que 11 estaciones registraron valores iguales o por debajo de sus valores normales. Las estaciones con mayor incidencia respecto a valores por sobre su normal son Puerto Suarez, Cañas – TJ y Turumayo – TJ.

Gráfico 30




Fuente: SENAMHI

C. Anomalías de Temperaturas Máximas.

En el **gráfico Nro. 31** muestra la anomalía de la temperatura máxima media durante el mes de enero 2026, se registraron 39 estaciones de monitoreo que presentaron anomalías positivas en Bolivia reflejando mayor incidencia en las estaciones de Puerto Suarez, Cañas – TJ, Magdalena y Turumayo - TJ, asimismo se presentaron anomalías negativas en 11 estaciones de monitoreo, resaltando las de mayor incidencia a Cotagaita – PO y Uyuni – Aeropuerto.

Gráfico 31




Fuente: SENAMHI

D. Temperaturas Máximas Medias registradas en el mes de enero 2026.

En el **Mapa 3**, refleja que, durante el mes de enero de 2026, las temperaturas máximas medias en Bolivia mostraron dos comportamientos diferenciados. Las macrorregiones de Amazonía, Llanuras, Chiquitanía y Chaco mantuvieron un clima caluroso con registros de entre 29 °C y 37 °C. En contraste, la zona occidental y de valles, específicamente en la mayoría de las macrorregiones de Altiplano, Valles e incluyendo gran parte de los Yungas – Chapare y zonas puntuales del Chaco reportaron valores significativamente menores, en una escala de 15 °C a 27 °C, conforme a los datos procesados por el SENAMHI.

Mapa 3




Fuente: SENAMHI

E. Comportamiento de las Temperaturas Máximas Medias y Anomalías del trimestre noviembre, diciembre 2025 y enero 2026.

En el **gráfico Nro. 32** se observa que el comportamiento de las temperaturas máximas medias trimestrales, 30 de las estaciones de monitoreo de Bolivia presentaron valores por encima de sus normales (1991-2020), por otro lado, 20 estaciones registraron valores por debajo de su valor normal mensual, por otro lado, ninguna estación igualó el valor de su normal. Las estaciones con mayor incidencia respecto a valores por encima de su normal son Puerto Suarez, San Matías, Cañas – TJ, Turumayo – TJ y San Jacinto – TJ.


Gráfico 32



Fuente: SENAMHI

En el **gráfico Nro. 33**, se observa, las anomalías de las temperaturas máximas medias del trimestre noviembre, diciembre 2025 y enero 2026, durante el monitoreo se registraron 32 estaciones de monitoreo que presentaron anomalías positivas en Bolivia reflejando mayor incidencia en las estaciones de Puerto Suarez, Cañas – TJ, San Jacinto -TJ y Turumayo -TJ, asimismo se presentaron anomalías negativas en 18 estaciones de monitoreo, resaltando las de mayor incidencia a Rurrenabaque y Potosí - Aeropuerto.


Gráfico 33



Fuente: SENAMHI

En el **Mapa 4**, se muestra el análisis trimestral para el trimestre noviembre, diciembre del 2025 y enero 2026, donde es evidente que las mayores temperaturas máximas medias se concentraron en las regiones del norte y oriente boliviano. La Amazonía, Llanuras-Sabanas, Chiquitanía y gran parte del Chaco presentaron valores constantes entre 29 °C y 37 °C. Por su parte, el sector occidental, comprendido por el Altiplano y los Valles, incluyendo gran parte de los Yungas – Chapare y en algunas zonas al oeste del Chaco registraron condiciones más frescas con temperaturas entre 16 °C y 28 °C, extendiéndose este comportamiento.

Mapa 4




Fuente: SENAMHI

IV. Temperaturas Mínimas Mensuales registradas en el mes de enero 2026.

A. Temperaturas Mínimas Extremas.

En el **gráfico Nro. 34** muestra que, ninguna de las estaciones de monitoreo registró valores de temperaturas mínimas inferiores a su valor histórico.

Gráfico 34




Fuente: SENAMHI

B. Temperaturas Mínimas Medias Mensuales.

En el **gráfico Nro. 35**, muestra que, 32 estaciones de monitoreo en Bolivia registraron valores de temperaturas por encima de sus valores normales, asimismo 18 estaciones presentaron valores por debajo de sus normales. La estación con mayor incidencia respecto a valores por debajo de su normal fue Uyuni – Aeropuerto.

Gráfico 35




Fuente: SENAMHI

C. Anomalías de Temperaturas Mínimas.

En el **gráfico Nro. 36**, se observa, las anomalías de las temperaturas mínimas medias del mes de enero 2026, el gráfico refleja el comportamiento de las anomalías en gran parte de las estaciones de monitoreo fueron positivas donde 27 estaciones presentaron este comportamiento, las estaciones de mayor incidencia fueron Uyuni – PO y Turumayo – TJ sin embargo, también se registraron estaciones que presentaron anomalías negativas, las cuales responden a una cantidad de 13 con una mayor incidencia en las estaciones de Puerto Suarez y Uyuni - Aeropuerto.

Gráfico 36




Fuente: SENAMHI

D. Temperaturas Mínimas Medias registradas en el mes de enero 2026.

En el **Mapa 5**, de acuerdo al análisis del comportamiento térmico para enero de 2026, se revela dos escenarios diferenciados. En el bloque occidental, que abarca el Altiplano, gran parte de los Valles y puntualmente en los Yungas-Chapare, se identificaron las temperaturas mínimas más frías, con un gradiente que inicia en los 3 °C y alcanza los 16 °C en las zonas de transición. En contraparte, las regiones del norte y oriente boliviano como la Amazonía, Llanuras-Sabanas, Chiquitanía y la región del Chaco presentaron un comportamiento mucho más templado, con valores mínimos registrados de forma sostenida entre los 18 °C y 24 °C.

Mapa 5




Fuente: SENAMHI

E. Comportamiento de las Temperaturas Mínimas Medias y Anomalías del trimestre noviembre, diciembre 2025 y enero 2026.

En el **gráfico Nro. 37**, se observa el comportamiento de las temperaturas mínimas medias trimestrales, en los que 28 estaciones registraron valores por encima de sus normales (1991-2020), sin embargo, 16 estaciones registraron valores por debajo de su valor normal. Las estaciones con mayor incidencia respecto a valores por debajo de su normal son Uyuni – Aeropuerto, Puerto Suarez y Cochabamba – Sarco.


Gráfico 37



Fuente: SENAMHI

En **el gráfico Nro. 38**, se observa, las anomalías de las temperaturas mínimas medias del trimestre noviembre, diciembre 2025 y enero 2026, el gráfico muestra que 30 estaciones reflejaron un comportamiento de las anomalías positivas las estaciones de mayor incidencia fueron Cotagaita – PO y Uyuni – PO, sin embargo, también se registraron 20 estaciones que presentaron anomalías negativas con una mayor incidencia en las estaciones de Puerto Suarez, y Uyuni – Aeropuerto.


Gráfico 38



Fuente: SENAMHI

En el **Mapa 6**, de acuerdo con el análisis del comportamiento térmico detallado, el registro de las temperaturas mínimas medias para el trimestre de noviembre, diciembre de 2025 y enero 2026 revela una marcada división térmica en el territorio boliviano. En el sector occidental, que comprende las macrorregiones del Altiplano, gran parte de los Valles y los Yungas – Chapare, se identificaron las condiciones más frías del periodo, con valores mínimos que oscilaron significativamente entre los 2 °C y los 16 °C. Por el contrario, en las tierras bajas correspondientes a las macrorregiones de la Amazonía, Llanuras y Sabanas, Chiquitanía y la región del Chaco, se presentó un ambiente mucho más templado y homogéneo, con registros de temperaturas mínimas medias que se mantuvieron de forma sostenida entre los 17 °C y 24 °C.

Mapa 6



Fuente: SENAMHI



MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA



Calle Reyes Ortiz N° 41 - 3er piso
Teléfonos Of. Central: 2355824 – 2129586 - 2129583
<http://www.senamhi.gob.bo>